

# Cu-L POLKEL

CONCIME INORGANICO SEMPLICE A BASE DI MICROELEMENTI

Concime a base di microelementi chelati in soluzione



**Cu-L POLKEL** è un concime liquido a base di Rame totalmente chelato con EDTA adatto per impieghi fogliari, in fertirrigazione e in idroponia.

La forma completamente chelata garantisce un'elevata capacità di assorbimento e traslocazione a livello fogliare e stomatico. Il Rame è un importante micronutriente indispensabile alla vita delle piante. All'interno dei vegetali **Cu-L POLKEL** svolge un ruolo di primaria importanza nel processo fotosintetico, nella stabilizzazione della clorofilla e di altri pigmenti, nella sintesi di enzimi indispensabili nel processo respiratorio e nella sintesi di proteine e carboidrati. **Cu-L POLKEL** ha dimostrato la massima efficacia nella risoluzione delle fisiopatie causate dalla carenza di Rame e nell'aumentare la formazione e la maturazione delle spighe dei cereali.

## SINTOMI DI CARENZA DA RAME:

- Nanismo, internodi corti, clorosi;
- Foglie strette a spirale (mais a manico di panier);
- Necrosi della parte alta della pianta e delle foglie più giovani che tendono a cadere;
- Difficoltà di crescita delle spighe, spighe vuote (cereali);
- Decolorazione delle foglie con arrotolamento ai margini;
- Frutti con escrescenze gommose.

COMPOSIZIONE (p/p)		
	Unità di misura	Valore
Rame (Cu), chelato con EDTA, idrosolubile	%	9
Intervallo di pH che garantisce una stabilità accettabile della frazione chelata con EDTA: 4-9		

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE	
FORMULAZIONE	liquida
COLORE	blu
DENSITÀ (g/cm <sup>3</sup> ) 20°C	1,25
pH	7,3 ± 0,5



## CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO	Coltura	Applicazione	Dose
Fogliare	Frutticole	3-5 durante il ciclo colturale	50-100 g/hl
	Orticole	2-3 durante il ciclo colturale	80-120 g/hl
	Floricole	1-2 durante il ciclo colturale	50-100 g/hl
	Colture industriali	3-5 durante il ciclo colturale	80-120 g/hl
Radicale	Frutticole		2-3 kg/ha
	Orticole		2-3 kg/ha
	Floricole		1-2 kg/ha
	Colture industriali		1-2 kg/ha
Come defogliante	Frutticole	al 40% delle foglie cadute	12-15 kg/ha
	Vivai di fruttiferi	8 giorni prima dell'estirpazione	20 kg/ha
	Colture industriali		15-20 kg/ha
In serra ridurre i dosaggi del 30%			

### MODALITÀ D'USO

**Cu-L POLKEL** è miscibile con i comuni trattamenti fatta eccezione per gli oli minerali.  
Dato l'elevato numero di specie si consiglia di eseguire una prova su un numero limitato di piantine prima di estendere il trattamento.

### CONFEZIONI

Flacone 1 kg