

ANCHOR

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

Inoculo di funghi micorrizici



ANCHOR è un prodotto in sospensione a base di funghi micorrizici e batteri, che stimola lo sviluppo radicale e fogliare delle piante orticole, floricole, frutticole, di tappeti erbosi e cereali.

I microrganismi, nel loro processo di sviluppo e colonizzazione dell'apparato radicale, forniscono spinta alle plantule emergenti, incrementando lo sviluppo del capillizio radicale e migliorando lo status nutrizionale. La presenza di micorrize, agevola inoltre l'apparato radicale nell'assorbimento di elementi nutrizionali, di macro-microelementi e di acqua grazie alla simbiosi che si stabilisce tra microorganismo e apparato radicale.

VANTAGGI:

- stimola la radicazione favorendo lo sviluppo in profondità della radice
- superamento stress da trapianto attraverso la produzione di auxine che incrementano l'efficienza dell'apparato radicale
- migliora la capacità di scambio cationico nel suolo
- nutre e stimola il microbioma del terreno
- produzione di metaboliti antibiotici

COMPOSIZIONE (p/p)		
	Unità di misura	Valore
Tipo di ammendante organico: ammendante vegetale semplice non compostato		
Contenuto in Micorrize (Glomus spp.)	%	0.001% (%in peso)
Contenuto in batteri della rizosfera	g	1x10 ⁷ (UFC/g)

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE	
FORMULAZIONE	liquida
COLORE	marrone
DENSITÀ (g/cm ³) 20°C	1.2
pH	6 ± 0.5



CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Coltura	Applicazione RADICALE	Dose
Vite	Trattamento barbatelle per immersione	0.5 kg/hl d'acqua
	Al trapiano	10 kg/ha
	Al risveglio vegetativo e post raccolta	10 kg/ha *
Nocciolo	Al trapianto	10 kg/ha
	Al risveglio vegetativo e post raccolta	10 kg/ha *
Frutticole	Al trapianto	10 kg/ha
	Al risveglio vegetativo e post raccolta	10 kg/ha *
Orticole in serra e pieno campo (pomodori, peperoni, cucurbitacee, lattughe, ecc.)	Trattamento in vasetto per immersione	0.5 kg/hl d'acqua
	Trapianto e dopo 10-15 gg	10 kg/ha
Tappeti erbosi, turf, impianti sportivi	Durante la stagione vegetativa trattare ogni 30 giorni	10 kg/ha *
Floricole e Ornamentali	Trattamento in vasetto per immersione	0.5 kg/hl d'acqua
	Trapianto e dopo 10-15 gg	10 kg/ha

* Ripetere il trattamento se necessario

MODALITÀ D'USO

ANCHOR è compatibile con concimi, insetticidi, acaricidi, nematocidi e fungicidi ad eccezione di prodotti fortemente acidi (pH <3) o alcalini (pH >8.5). Se possibile, acidificare la soluzione a pH 6 preferibilmente con acidi organici (citrico, acetico). Non miscelare con prodotti a base di rame o distanziare il trattamento almeno 48/72 ore. Impiegare con volumi di acqua adeguati alla corretta bagnatura. Utilizzare nelle ore più fresche della giornata. Per una maggiore attivazione, miscelare con IDROL-VEG® alla dose di 10kg/ha

CONFEZIONI

Tanica 5 kg