

Cu-L POLKEL

CONCIME INORGANICO SEMPLICE A BASE DI MICROELEMENTI

Concime a base di microelementi chelati in soluzione



Cu-L POLKEL è un concime liquido a base di Rame totalmente chelato con EDTA adatto per impieghi fogliari, in fertirrigazione e in idroponia.

La forma completamente chelata garantisce un'elevata capacità di assorbimento e traslocazione a livello fogliare e stomatico. Il Rame è un importante micronutriente indispensabile alla vita delle piante. All'interno dei vegetali **Cu-L POLKEL** svolge un ruolo di primaria importanza nel processo fotosintetico, nella stabilizzazione della clorofilla e di altri pigmenti, nella sintesi di enzimi indispensabili nel processo respiratorio e nella sintesi di proteine e carboidrati. **Cu-L POLKEL** ha dimostrato la massima efficacia nella risoluzione delle fisiopatie causate dalla carenza di Rame e nell'aumentare la formazione e la maturazione delle spighe dei cereali.

SINTOMI DI CARENZA DA RAME:

- nanismo, internodi corti, clorosi;
- foglie strette a spirale (mais a manico di panier);
- necrosi della parte alta della pianta e delle foglie più giovani che tendono a cadere;
- difficoltà di crescita delle spighe, spighe vuote (cereali);
- decolorazione delle foglie con arrotolamento ai margini;
- frutti con escrescenze gommose.

COMPOSIZIONE (p/p)		
	Unità di misura	Valore
Rame (Cu), chelato con EDTA, idrosolubile	%	9
Intervallo di pH che garantisce una stabilità accettabile della frazione chelata con EDTA: 4-9		

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE	
FORMULAZIONE	liquida
COLORE	blu
DENSITÀ (g/cm ³) 20°C	1,25
pH	7,3 ± 0,5



DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO	Coltura	Applicazione	Dose
Fogliare	Frutticole	3-5 durante il ciclo colturale	50-100 g/hl
	Orticole	2-3 durante il ciclo colturale	80-120 g/hl
	Floricole	1-2 durante il ciclo colturale	50-100 g/hl
	Colture industriali	3-5 durante il ciclo colturale	80-120 g/hl
Radicale	Frutticole		2-3 kg/ha
	Orticole		2-3 kg/ha
	Floricole		1-2 kg/ha
	Colture industriali		1-2 kg/ha
Come defogliante	Frutticole	al 40% delle foglie cadute	12-15 kg/ha
	Vivai di fruttiferi	8 giorni prima dell'estirpazione	20 kg/ha
	Colture industriali		15-20 kg/ha
In serra ridurre i dosaggi del 30%			

MODALITÀ D'USO

Cu-L POLKEL è miscibile con i comuni trattamenti fatta eccezione per gli olii minerali.
Dato l'elevato numero di specie si consiglia di eseguire una prova su un numero limitato di piantine prima di estendere il trattamento.

CONFEZIONI

Flacone 1 kg