

# Terra-Sorb® fogliare

CONCIME ORGANICO AZOTATO

Carniccio fluido in sospensione N +C 3 +15



Gli aminoacidi contenuti nel **Terra-Sorb® fogliare** sono tutti ottenuti da un processo di idrolisi enzimatica brevettato.

Gli L- $\alpha$  aminoacidi liberi (10%) penetrano nelle cellule delle piante aumentando l'attività fotosintetica ed il contenuto in clorofilla delle stesse, intervenendo inoltre come regolatori di numerosi processi metabolici.

L'uso è consigliato in tutte le fasi in cui la coltivazione ha bisogno di uno stimolo nutritivo e fisiologico come:

- Inizio vegetativo, appena raggiunge una sufficiente massa fogliare
- Pre-fioritura e caduta petali
- Sviluppo dei frutti

**Terra-Sorb® fogliare** impiegato sul grano garantisce un aumento di produttività.

L'applicazione è consigliata anche quando la coltivazione si trova sottoposta a condizioni sfavorevoli (sicchezza, freddo, salinità, vento, asfissia radicale) o a cure di recupero dopo stress (trapianti, danni da gelate, grandine).

COMPOSIZIONE (p/p)		
	Unità di misura	Valore
Azoto (N) organico	%	3
Azoto (N) organico solubile	%	3
Carbonio (C) organico	%	15

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE	
FORMULAZIONE	liquida
COLORE	verde
DENSITÀ (g/cm <sup>3</sup> ) 20°C	1.14
pH (soluzione 1% p/p)	7.0 ± 0.5

CONFEZIONI	
Tanica	5 l



## CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

### AMINOGRAMMA (% p/p)

ACIDO ASPARTICO	(0.40)	LEUCINA	(0.62)
ACIDO GLUTAMMICO	(2.80)	LISINA	(0.46)
ALANINA	(0.44)	METIONINA	(0.16)
ARGININA	(0.34)	PROLINA	(0.30)
CISTEINA	(0.02)	SERINA	(0.36)
FENILALANINA	(0.29)	TIROSINA	(0.14)
GLICINA	(2.25)	TREONINA	(0.36)
ISTIDINA	(0.30)	TRIPTOFANO	(0.05)
ISOLEUCINA	(0.34)	VALINA	(0.42)

### DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

	Coltura	Applicazione	Dose
Fogliare	Frutticole	2-4 durante i periodi critici	200-300 ml/hl (2-3 l/ha)
	Orticole		
	Floricole		
	Colture industriali		
	Cereali	da inizio accestimento a prefioritura	200-250 ml/hl (2-2.5 l/ha)

Regolare le applicazioni in funzione delle necessità della coltivazione.

Prodotto indicato da utilizzare in condizioni di stress: trapianto, basse e alte temperature, siccità, asfissia, salinità, gelo, grandine, fitotossicità, malattie.

Indicato in caso di gelate; applicare 2-3 giorni prima se si prevede un forte abbassamento di temperatura (prevenzione) e nelle prime ore pomeridiane successive alla gelata notturna.

### MODALITÀ D'USO

**Terra-Sorb® fogliare** si può miscelare con la maggior parte dei concimi e fitosanitari abituali. In miscela con prodotti a base di Rame, Zolfo, e olii si raccomanda di non superare la dose di 150 ml/hl. In caso di richiesta di dosaggio maggiore, effettuare preliminarmente prova sulla coltura. Per qualsiasi dubbio o chiarimento rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico.